

Exploitation : Domaine de Sandricourt
Parcelle : Le Château d'Eau
Type de sol : Brunisol (Limon intermédiaire)

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	36	
Chénopode hybride	35	
Ray-grass	36	
Renouée persicaire	35	
Brome mou	37	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	50 gr/m ²
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Chénopode hybride 3	Chénopode hybride -6	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille :	Déc-d2 Oct-d1 Aoû-d3	Chénopode 24
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -1	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 89
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 98

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	385 gr/m ²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2
Chénopode hybride 8	Chénopode hybride -4	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -2
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1 Nov-d3 Oct-d2 Oct-d1	Chénopode 1
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 1	Chénopode 1
Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -1	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 1
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 28
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 38

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2 Chénopode 11 Chénopode hybride 8 Ray-grass 52 Renouée persicaire 0 Brome mou 71	Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Chénopode hybride -4 Ray-grass -4 Renouée persicaire -4 Brome mou -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Sep-d3 Chénopode 0 Chénopode hybride 0 Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Brome mou 0	Pas de labour Chénopode 0 Chénopode hybride 0 Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Brome mou 0	384 gr/m ² Chénopode -2 Chénopode hybride -2 Ray-grass -2 Renouée persicaire -2 Brome mou -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Chénopode 0 Chénopode hybride 0 Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Brome mou 0	Moyennement couvrante Chénopode -1 Chénopode hybride -1 Ray-grass -1 Renouée persicaire -1 Brome mou -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Chénopode hybride 0 Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Brome mou 0	Oct-d2 Oct-d1 Sep-d3 Chénopode 0 Chénopode hybride 0 Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Brome mou 0	Chénopode 4 Chénopode hybride 1 Ray-grass 45 Renouée persicaire 0 Brome mou 64

Année 4 - Tournesol



Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Chénopode 8 Chénopode hybride 8 Ray-grass 35 Renouée persicaire 0 Brome mou 45	Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Chénopode hybride -4 Ray-grass -4 Renouée persicaire -4 Brome mou -4	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Chénopode hybride 0 Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Brome mou 0	Pas de labour Chénopode 0 Chénopode hybride 0 Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Brome mou 0	385 gr/m ² Chénopode -2 Chénopode hybride -2 Ray-grass -2 Renouée persicaire -2 Brome mou -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Chénopode 0 Chénopode hybride 0 Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Brome mou 0	Moyennement couvrante Chénopode -1 Chénopode hybride -1 Ray-grass -1 Renouée persicaire -1 Brome mou -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Chénopode hybride 0 Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Brome mou 0	Nov-d2 Nov-d1 Oct-d3 Chénopode 1 Chénopode hybride 1 Ray-grass 28 Renouée persicaire 0 Brome mou 38	Chénopode 1 Chénopode hybride 1 Ray-grass 28 Renouée persicaire 0 Brome mou 38