


Scénario : Nouveau scénario  
Exploitation : P. Fourdrinier - GIEE Airon  
Parcelle : Collen  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	27 ( 31) 

## Système de culture

Scénario :

### Année 1 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Oct-d2"/> Ray-grass 48	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <input type="text" value="Aoû-d1"/> Date de semis du couvert : <input type="text" value="Aoû-d2"/> Date de destruction : <input type="text" value="Jan-d2"/> Ray-grass -2	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 200 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Ray-grass -1	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Ray-grass -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Ray-grass 35

### Année 2 - Betteraves

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Mar-d3"/> Ray-grass 33	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <input type="text" value="Mar-d1"/> <input type="text" value="Fév-d2"/> <input type="text" value="Jan-d3"/> Date de semis du couvert : <input type="text" value="Aoû-d2"/> Date de destruction : <input type="text" value="Déc-d2"/> Ray-grass -2	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 15 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 45 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <input type="text" value="Mai-d3"/> <input type="text" value="Mai-d1"/> Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -1	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Ray-grass 31

### Année 3 - Orge de printemps

<b>Date de semis</b> Fév-d2 Ray-grass 21	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Fév-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Jan-d2 Ray-grass -0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Ray-grass -1	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 9

### Année 4 - Pois de printemps

<b>Date de semis</b> Mar-d2 Ray-grass 35	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Mar-d1 Fév-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2 Ray-grass -2	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 75 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 33

### Année 5 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d2 Ray-grass 88	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Autre culture de print. Fort Ray-grass -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 35 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Ray-grass -2	<b>Variété</b> Très couvrante Ray-grass -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 74

### Année 6 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Ray-grass 52	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Autre culture de print. Fort Ray-grass -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 200 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Ray-grass -1	<b>Variété</b> Très couvrante Ray-grass -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 39

### Année 7 - Haricot

<b>Date de semis</b> Jun-d1 Ray-grass 1	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Mai-d2 Avr-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -2	<b>Date de labour</b> Jan-d1 Ray-grass -3	<b>Densité de semis</b> 35 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 45 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Jun-d3 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 0