

Exploitation : MEURANT LUDOVIC
 Parcelle : AA
 Type de sol : Limon argileux profon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	60



Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0	Densité de semis 260 gr/m ² Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 6

Année 2 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Chénopode 68	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d1 Mar-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d2 Chénopode -5	Date de labour Déc-d2 Chénopode -2	Densité de semis 106 gr/m ² Chénopode 0
Entre rangs 75 cm Chénopode 0	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 60

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0	Densité de semis 260 gr/m ² Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 6

Année 4 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Aoû-d1 Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d2 Chénopode -2	Date de labour Déc-d2 Chénopode -2	Densité de semis 100 gr/m ² Chénopode 0
Entre rangs 50 cm Chénopode 0	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -5	Désherbage chimique Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1	Score annuel Chénopode 55

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0	Densité de semis 260 gr/m ² Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 6

Année 6 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d2 Chénopode 63	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Aoû-d1 Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d2 Chénopode -2	Date de labour Déc-d2 Chénopode -2	Densité de semis 5 gr/m ² Chénopode 0
Entre rangs 90 cm Chénopode 0	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 58