

Scénario : Nouveau scénario  
 Exploitation : MEURANT LUDOVIC  
 Parcelle : AA  
 Type de sol : Limon argileux profon

#### Commentaires :



#### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	55 ( 60 )

## Système de culture

#### Scénario :

### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis  Oct-d2  Chénopode 11	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Faible  Chénopode -4	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie  Date de destruction : Non définie  Chénopode 0	Date de labour  Pas de labour  Chénopode 0	Densité de semis  260 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0
Entre rangs  15 cm  Chénopode -1	Variété  Non couvrante  Chénopode 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode 0	Désherbage chimique  Chénopode 0	Score annuel  Chénopode 6

### Année 2 - Maïs

Date de semis  Mai-d1  Chénopode 57	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Très faible  Chénopode 0	Interculture  Date des faux semis : Sep-d1 Mai-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d2  Chénopode -5	Date de labour  Déc-d2  Chénopode -2	Densité de semis  106 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0
Entre rangs  75 cm  Chénopode 0	Variété  Non couvrante  Chénopode 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode 0	Désherbage chimique  Chénopode 0	Score annuel  Chénopode 50

### Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis  Oct-d2  Chénopode 11	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Faible  Chénopode -4	Interculture  Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Chénopode -0	Date de labour  Pas de labour  Chénopode 0	Densité de semis  260 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0
Entre rangs  15 cm  Chénopode -1	Variété  Non couvrante  Chénopode 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel  Chénopode 6

### Année 4 - Betteraves

Date de semis  Mar-d2  Chénopode 64	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Très faible  Chénopode 0	Interculture  Date des faux semis : Aoû-d1 Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d2  Chénopode -2	Date de labour  Déc-d2  Chénopode -2	Densité de semis  100 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0
Entre rangs  50 cm  Chénopode 0	Variété  Non couvrante  Chénopode 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode -5	Désherbage chimique  Avr-d2 Avr-d3 Avr-d1	Score annuel  Chénopode 55

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis  Oct-d2  Chénopode 11	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Faible  Chénopode -4	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Chénopode 0	Date de labour  Pas de labour  Chénopode 0	Densité de semis  260 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0
Entre rangs  15 cm  Chénopode -1	Variété  Non couvrante  Chénopode 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel  Chénopode 6

## Année 6 - Pomme de terre

Date de semis  Avr-d3  Chénopode 57	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Très faible  Chénopode 0	Interculture  Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d2  Chénopode -2	Date de labour  Déc-d2  Chénopode -2	Densité de semis  5 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0
Entre rangs  90 cm  Chénopode 0	Variété  Non couvrante  Chénopode 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel  Chénopode 53