

Exploitation :

Benoît Decoene

Parcelle :

Ateliers créativité - Court

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|---------------------|----------|
| Ray-grass | 36 |
| Chénopode | 50 |
| Vulpin | 36 |
| Renouée des oiseaux | 59 |

Système de culture

Situation initiale :

| Année 1 - Betteraves | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
| Avr-d2 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Aoû-d3 | Nov-d2 | Non défini |
| Ray-grass 19 | Ray-grass 0 | Date de semis du couvert : Sep-d1 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 |
| Chénopode 63 | Chénopode 0 | Date de destruction : Non définie | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Vulpin 21 | Vulpin 0 | Ray-grass -4 | Vulpin -5 | Vulpin 0 |
| Renouée des oiseaux 110 | Renouée des oiseaux 0 | Chénopode -2 | Renouée des oiseaux -2 | Renouée des oiseaux 0 |
| | | Vulpin -3 | | |
| | | Renouée des oiseaux 0 | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 45 cm | Non couvrante | Bineuse : Mai-d3 | | Ray-grass 12 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Houe rotative : | | Chénopode 57 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Herse étrille : | | Vulpin 14 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Ray-grass 0 | | Renouée des oiseaux 106 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Chénopode -2 | | |
| | | Vulpin 0 | | |
| | | Renouée des oiseaux -3 | | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 250 gr/m ² |
| Ray-grass 52 | Ray-grass -4 | Ray-grass -3 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Chénopode 11 | Chénopode -4 | Chénopode -0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Renouée des oiseaux 9 | Renouée des oiseaux -4 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 45 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 7 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 52 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 5 |

Année 3 - Lin de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|--|---|------------------------|-------------------------|
| Avr-d1 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie | Nov-d2 | 2000 gr/m ² |
| Ray-grass 27 | Ray-grass 0 | Ray-grass -4 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 |
| Chénopode 66 | Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Vulpin 28 | Vulpin 0 | Vulpin -5 | Vulpin -5 | Vulpin 0 |
| Renouée des oiseaux 123 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -2 | Renouée des oiseaux -2 | Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 19 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 63 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 21 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 122 |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Oct-d1 Aoû-d3 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 250 gr/m ² |
| Ray-grass 52 | Ray-grass -4 | Ray-grass -14 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Chénopode 11 | Chénopode -4 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin -14 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Renouée des oiseaux 9 | Renouée des oiseaux -4 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 34 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 3 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 42 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 5 |

Année 5 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 300 gr/m ² |
| Ray-grass 66 | Ray-grass -10 | Ray-grass -5 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Chénopode 9 | Chénopode -10 | Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Vulpin 83 | Vulpin -10 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -10 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 51 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 0 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 69 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 0 |

Année 6 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|--|--|---|
| Aoû-d3  Ray-grass 96  Chénopode 31  Vulpin 89  Renouée des oiseaux 0 | Association de cultures : Aucune Moyen  Ray-grass -6  Chénopode -6  Vulpin -6  Renouée des oiseaux -6 | Date des faux semis :  Aoû-d2  Aoû-d1 Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie  Ray-grass -5  Chénopode -3  Vulpin -1  Renouée des oiseaux 0 |  Aoû-d3  Ray-grass -6  Chénopode -2  Vulpin -6  Renouée des oiseaux -2 | 35 gr/m ²  Ray-grass 0  Chénopode 0  Vulpin 0  Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs 15 cm  Ray-grass -2  Chénopode -2  Vulpin -2  Renouée des oiseaux -2 | Variété Non couvrante  Ray-grass 0  Chénopode 0  Vulpin 0  Renouée des oiseaux 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0  Chénopode 0  Vulpin 0  Renouée des oiseaux 0 | Désherbage chimique | Score annuel  Ray-grass 77  Chénopode 18  Vulpin 73  Renouée des oiseaux 0 |