






Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

GAEC du Chateau
Test 1
Argile profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|-------------------|----------|---|
| Chénopode | 41 |  |
| Ray-grass | 0 |  |
| Vulpin | 0 |  |
| Panic pied-de-coq | 33 |  |
| Matricaire | 43 |  |

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|---|--|----------------------|---------------------|
| Nov-d1 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Sep-d1 | 350 gr/m² |
| Chénopode 6 | Chénopode -4 | Chénopode -1 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 18 | Ray-grass -4 | Ray-grass -4 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 14 | Vulpin -4 | Vulpin -6 | Vulpin -7 | Vulpin 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -4 | Panic pied-de-coq -0 | Panic pied-de-coq -3 | Panic pied-de-coq 0 |
| Matricaire 23 | Matricaire -4 | Matricaire -1 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|----------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 | | |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | | Chénopode 0 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | | Ray-grass 0 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | | Vulpin 0 |
| Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | Panic pied-de-coq 0 |
| Matricaire -2 | Matricaire 0 | Matricaire -2 | | Matricaire 10 |

Année 2 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|--|---|----------------------|---------------------|
| Mai-d1 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1 Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Non définie | Fév-d2 | 10 gr/m² |
| Chénopode 57 | Chénopode 0 | Chénopode -10 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 6 | Ray-grass 0 | Ray-grass -5 | Ray-grass -3 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 9 | Vulpin 0 | Vulpin -5 | Vulpin -5 | Vulpin 0 |
| Panic pied-de-coq 73 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 |
| Matricaire 39 | Matricaire 0 | Matricaire -7 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|----------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|
| 60 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Mai-d2 Mai-d1 Herse étrille : | | |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode -8 | | Chénopode 36 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | | Ray-grass 0 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin -2 | | Vulpin 0 |
| Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -7 | | Panic pied-de-coq 61 |
| Matricaire -2 | Matricaire 0 | Matricaire -5 | | Matricaire 24 |

Année 3 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|--|---|---|
| <div>Mai-d1</div> <div>Chénopode 52</div> <div>Ray-grass 5</div> <div>Vulpin 9</div> <div>Panic pied-de-coq 58</div> <div>Matricaire 36</div> | <div>Association de cultures : Aucune Très faible</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Matricaire 0</div> | <div>Date des faux semis : Avr-d1 Avr-d2 Avr-d3</div> <div>Date de semis du couvert : Non définie</div> <div>Date de destruction : Non définie</div> <div>Chénopode -10</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Matricaire -7</div> | <div>Fév-d2</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Panic pied-de-coq -2</div> <div>Matricaire -1</div> | <div>50 gr/m²</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Matricaire 0</div> |
| <div>Entre rangs</div> <div>40 cm</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Matricaire 0</div> | <div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Matricaire 0</div> | <div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Jun-d1</div> <div>Houe rotative : Mai-d2 Mai-d1</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Panic pied-de-coq -5</div> <div>Matricaire -1</div> | <div>Désherbage chimique</div> | <div>Score annuel</div> <div>Chénopode 39</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Panic pied-de-coq 50</div> <div>Matricaire 26</div> |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| Nov-d1 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Sep-d3 Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 350 gr/m² |
| Chénopode 6 | Chénopode -4 | Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 18 | Ray-grass -4 | Ray-grass -9 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 14 | Vulpin -4 | Vulpin -11 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -4 | Panic pied-de-coq -1 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 |
| Matricaire 23 | Matricaire -4 | Matricaire -3 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|----------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 | | |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | | Chénopode 0 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | | Ray-grass 2 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | | Vulpin 0 |
| Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | Panic pied-de-coq 0 |
| Matricaire -2 | Matricaire 0 | Matricaire -2 | | Matricaire 10 |

Année 5 - Tournesol

Date de semis

Mai-d1

| | |
|-------------------|----|
| Chénopode | 52 |
| Ray-grass | 5 |
| Vulpin | 9 |
| Panic pied-de-coq | 58 |
| Matricaire | 36 |

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

| | |
|-------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Panic pied-de-coq | 0 |
| Matricaire | 0 |

Interculture

Date des faux semis :
Avr-d1 Avr-d2 Avr-d3

Date de semis du couvert :
Jul-d3

Date de destruction :
Non définie

| | |
|-------------------|-----|
| Chénopode | -10 |
| Ray-grass | -5 |
| Vulpin | -5 |
| Panic pied-de-coq | 0 |
| Matricaire | -7 |

Date de labour

Fév-d2

| | |
|-------------------|----|
| Chénopode | -1 |
| Ray-grass | -3 |
| Vulpin | -5 |
| Panic pied-de-coq | -2 |
| Matricaire | -1 |

Densité de semis

7 gr/m²

| | |
|-------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Panic pied-de-coq | 0 |
| Matricaire | 0 |

Entre rangs

60 cm

| | |
|-------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Panic pied-de-coq | 0 |
| Matricaire | 0 |

Variété

Non couvrante

| | |
|-------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Panic pied-de-coq | 0 |
| Matricaire | 0 |

Désherbage mécanique

Bineuse :
Jun-d1 Mai-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

| | |
|-------------------|----|
| Chénopode | -5 |
| Ray-grass | -1 |
| Vulpin | -1 |
| Panic pied-de-coq | -5 |
| Matricaire | -3 |

Désherbage chimique

Score annuel

| | |
|-------------------|----|
| Chénopode | 36 |
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Panic pied-de-coq | 50 |
| Matricaire | 24 |

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d1

| | |
|-------------------|----|
| Chénopode | 6 |
| Ray-grass | 18 |
| Vulpin | 14 |
| Panic pied-de-coq | 0 |
| Matricaire | 23 |

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

| | |
|-------------------|----|
| Chénopode | -4 |
| Ray-grass | -4 |
| Vulpin | -4 |
| Panic pied-de-coq | -4 |
| Matricaire | -4 |

Interculture

Date des faux semis :
Sep-d3 Oct-d2
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

| | |
|-------------------|-----|
| Chénopode | -2 |
| Ray-grass | -9 |
| Vulpin | -11 |
| Panic pied-de-coq | -1 |
| Matricaire | -3 |

Date de labour

Sep-d1

| | |
|-------------------|----|
| Chénopode | -2 |
| Ray-grass | -6 |
| Vulpin | -7 |
| Panic pied-de-coq | -3 |
| Matricaire | -1 |

Densité de semis

350 gr/m²

| | |
|-------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Panic pied-de-coq | 0 |
| Matricaire | 0 |

Entre rangs

12 cm

| | |
|-------------------|----|
| Chénopode | -2 |
| Ray-grass | -2 |
| Vulpin | -2 |
| Panic pied-de-coq | -2 |
| Matricaire | -2 |

Variété

Non couvrante

| | |
|-------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Panic pied-de-coq | 0 |
| Matricaire | 0 |

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :
Mar-d1

| | |
|-------------------|----|
| Chénopode | -2 |
| Ray-grass | -1 |
| Vulpin | -1 |
| Panic pied-de-coq | 0 |
| Matricaire | -2 |

Désherbage chimique

Score annuel

| | |
|-------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Panic pied-de-coq | 0 |
| Matricaire | 9 |

Année 7 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|--|---|----------------------|---------------------|
| Mai-d1 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Avr-d1 Avr-d3 Avr-d2 Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Non définie | Fév-d2 | 10 gr/m² |
| Chénopode 57 | Chénopode 0 | Chénopode -10 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 6 | Ray-grass 0 | Ray-grass -5 | Ray-grass -3 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 9 | Vulpin 0 | Vulpin -5 | Vulpin -5 | Vulpin 0 |
| Panic pied-de-coq 73 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 |
| Matricaire 39 | Matricaire 0 | Matricaire -7 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|----------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|
| 60 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Mai-d2 Mai-d1 Herse étrille : | | |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode -8 | | Chénopode 36 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | | Ray-grass 0 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin -2 | | Vulpin 0 |
| Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -7 | | Panic pied-de-coq 61 |
| Matricaire -2 | Matricaire 0 | Matricaire -5 | | Matricaire 24 |