

Exploitation : scea du pré ranfroi
 Parcelle : pré ranfroy
 Type de sol : argilo calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	8
Chénopode	46
Matricaire	49
Amarante réfléchie	27

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Ray-grass 35 Chénopode 8 Matricaire 26 Amarante réfléchie 0	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort Ray-grass -10 Chénopode -10 Matricaire -10 Amarante réfléchie -10	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -4 Chénopode -1 Matricaire -1 Amarante réfléchie 0	Pas de labour Ray-grass 0 Chénopode 0 Matricaire 0 Amarante réfléchie 0	350 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0 Matricaire 0 Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -2 Chénopode -3 Matricaire -2 Amarante réfléchie 0		Ray-grass 19 Chénopode 0 Matricaire 13 Amarante réfléchie 0

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d3 Avr-d1	Pas de labour	8 gr/m ²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Date de semis du couvert : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 62	Chénopode 0	Date de destruction : Non définie	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Ray-grass -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Amarante réfléchie 52	Amarante réfléchie 0	Chénopode -6	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
		Matricaire -4		
		Amarante réfléchie 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
76 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d2		Ray-grass 7
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Houe rotative : Avr-d3		Chénopode 45
Chénopode 0	Chénopode 0	Herse étrille : Mai-d1		Matricaire 30
Matricaire 0	Matricaire 0	Ray-grass -2		Amarante réfléchie 45
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Chénopode -11		
		Matricaire -7		
		Amarante réfléchie -7		

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mai-d1 Avr-d2 Mar-d2	Pas de labour	60 gr/m ²
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Date de semis du couvert : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Date de destruction : Non définie	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 36	Matricaire 0	Ray-grass -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Amarante réfléchie 58	Amarante réfléchie 0	Chénopode -9	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
		Matricaire -7		
		Amarante réfléchie -0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
38 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jun-d2 Jun-d1 Mai-d3		Ray-grass 2
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Houe rotative : Mai-d1		Chénopode 35
Chénopode 0	Chénopode 0	Herse étrille : Mai-d2		Matricaire 23
Matricaire 0	Matricaire 0	Ray-grass 0		Amarante réfléchie 37
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Chénopode -8		
		Matricaire -6		
		Amarante réfléchie -20		

