

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

TAE_session_2
Système reconçu
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	24	
Vulpin	21	
Chénopode	60	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18 Vulpin 14 Chénopode 6	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Chénopode -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Date de labour Oct-d3 Ray-grass -10 Vulpin -14 Chénopode -3	Densité de semis 200 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 4 Vulpin 0 Chénopode 0

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Chénopode 68</div>	<div>Association de cultures : Aucune Très faible</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<div>Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1</div> <div>Date de semis du couvert : Sep-d1</div> <div>Date de destruction : Déc-d1</div> <div>Ray-grass -8</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Chénopode -3</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<div>Non défini</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>45 cm</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Chénopode -2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>		<div>Ray-grass 9</div> <div>Vulpin 14</div> <div>Chénopode 62</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Chénopode 11</div>	<div>Association de cultures : Aucune Faible</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Chénopode -4</div>	<div>Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d3</div> <div>Date de semis du couvert : Non définie</div> <div>Date de destruction : Non définie</div> <div>Ray-grass -9</div> <div>Vulpin -8</div> <div>Chénopode -3</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<div>250 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>17 cm</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>		<div>Ray-grass 39</div> <div>Vulpin 48</div> <div>Chénopode 4</div>

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	35 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 87
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 23

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d3 Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Nov-d3	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Jun-d2 Mai-d1	Ray-grass 16
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1	Mai-d3	Vulpin 20
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Chénopode 56

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Mar-d1</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Vulpin 36</div> <div>Chénopode 58</div>	<div>Association de cultures : Aucune Fort</div> <div>Ray-grass -10</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Chénopode -10</div>	<div>Date des faux semis : Fév-d3</div> <div>Date de semis du couvert : Non définie</div> <div>Date de destruction : Non définie</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div>	<div>Fév-d2</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Chénopode -3</div>	<div>200 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>
<div>Entre rangs</div> <div>17 cm</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse :</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<div>Désherbage chimique</div>	<div>Score annuel</div> <div>Ray-grass 16</div> <div>Vulpin 16</div> <div>Chénopode 44</div>