

Exploitation : Ferme Thomas Huyghe
Parcelle : Cimetière
Type de sol : Limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	27	
Chénopode	71	
Renouée liseron	64	
Mercuriale	68	
Ray-grass	27	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	27 gr/m ²
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 133	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Mercuriale 105	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d3 Aoû-d2 Aoû-d1 Jul-d3 Jul-d2 Jul-d1 Jun-d3 Jun-d2 Jun-d1 Mai-d3 Mai-d1 Avr-d2	Vulpin 14 Chénopode 56 Renouée liseron 132 Mercuriale 104 Ray-grass 11
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	229 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Nov-d2 Mai-d3 Mai-d1 Avr-d3 Mar-d3	Vulpin 54 Chénopode 5 Renouée liseron 0 Mercuriale 20 Ray-grass 46
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2	Pas de labour	10 gr/m ²
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Mercuriale 72	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Aoû-d3 Jul-d2 Jun-d1 Mai-d2 Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2 Fév-d2	Vulpin 28 Chénopode 66 Renouée liseron 108 Mercuriale 72 Ray-grass 27
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		