

Exploitation : Ferme Thomas Huyghe
Parcelle : Cimetière (alternatif)
Type de sol : Limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	58	
Renouée liseron	66	
Mercuriale	74	
Vulpin	20	
Ray-grass	19	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	27 gr/m ²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 133	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Mercuriale 105	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
 Entre rangs	 Variété	 Déssherbage mécanique	 Déssherbage chimique	 Score annuel
80 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d3 Aoû-d2 Aoû-d1 Jul-d3 Jul-d2 Jul-d1 Jun-d3 Jun-d2 Jun-d1 Mai-d3 Mai-d1 Avr-d2	Chénopode 53 Renouée liseron 130 Mercuriale 104 Vulpin 12 Ray-grass 9
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	229 gr/m ²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
 Entre rangs	 Variété	 Déssherbage mécanique	 Déssherbage chimique	 Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Nov-d2 Mai-d3 Mai-d1 Avr-d3 Mar-d3	Chénopode 5 Renouée liseron 0 Mercuriale 20 Vulpin 54 Ray-grass 46
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d1 Mar-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2	Pas de labour	10 gr/m ²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 133	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Mercuriale 105	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jun-d2 Mai-d2	Sep-d2 Aoû-d3 Jul-d2 Jun-d1 Mai-d2 Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2 Fév-d2	Chénopode 46 Renouée liseron 119 Mercuriale 94 Vulpin 10 Ray-grass 8
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -4		
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -11		
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale -10		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -1		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -0		