





Exploitation : baloo
Parcelle : bouy
Type de sol : crayeux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	53	
Folle-avoine	27	
Ray-grass	42	
Renouée liseron	17	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Oct-d3	Pas de labour	11.5 gr/m²
Chénopode 64	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jul-d1 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Mai-d2 Avr-d1 Mar-d1	Chénopode 55
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -3		Folle-avoine 83
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -2		Ray-grass 27
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -1		Renouée liseron 46
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -7		

Année 2 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 27	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 32	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 97	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
11.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Sep-d3 Herse étrille :		Chénopode 12
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1		Folle-avoine 18
Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -2		Ray-grass 79
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -5		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis <div>Mar-d2</div> <div>Chénopode 64</div> <div>Folle-avoine 90</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Renouée liseron 58</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Folle-avoine -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée liseron -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Oct-d3</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Densité de semis 11.5 gr/m ² <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs 50 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Chénopode -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Renouée liseron -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jul-d1</div> <div>Mai-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -3</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Renouée liseron -7</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d3</div> <div>Mai-d2</div> <div>Avr-d1</div> <div>Mar-d1</div>	Score annuel <div>Chénopode 55</div> <div>Folle-avoine 83</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Renouée liseron 46</div>

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Chénopode 5</div> <div>Folle-avoine 13</div> <div>Ray-grass 48</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Chénopode -6</div> <div>Folle-avoine -6</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Renouée liseron -6</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Date de labour <div>Oct-d2</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Renouée liseron -2</div>	Densité de semis 200 gr/m ² <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs 11.5 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée liseron -2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Chénopode -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Renouée liseron -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 2</div> <div>Ray-grass 37</div> <div>Renouée liseron 0</div>

Année 5 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 27	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 32	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 97	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
11.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Sep-d3 Herse étrille :	Avr-d3 Avr-d2	
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1		Chénopode 12
Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -2		Folle-avoine 18
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -5		Ray-grass 79
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	11.5 gr/m²
Chénopode 64	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d1	
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 58
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 85
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 28
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 53

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	250 gr/m²
Chénopode 2	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Folle-avoine 7	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Ray-grass 31	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
11.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 19
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 8 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Août-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 27	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 32	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 97	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
11.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Sep-d3 Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1		Chénopode 12
Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -2		Folle-avoine 18
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -5		Ray-grass 79
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0