


Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : Bosse Gauche 2  
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :


Adventices étudiées :



## Système de culture

Situation initiale :



## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Pas de labour	350 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 97	Gaillet -6	Date de destruction : Non définie	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -6	Gaillet 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Mercuriale 26	Mercuriale -6	Laiteron rude 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Matricaire 29	Matricaire -6	Mercuriale 0	Matricaire 0	Matricaire 0
		Matricaire 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0	Oct-d2 Nov-d1	Gaillet 88
Gaillet -2	Gaillet -1	Laiteron rude 0		Laiteron rude 20
Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Mercuriale 0		Mercuriale 17
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Matricaire 0		Matricaire 20
Matricaire -2	Matricaire -1			

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Aoû-d2	Pas de labour	310 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 64	Gaillet -6	Date de semis du couvert : Non définie	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 24	Laiteron rude -6	Date de destruction : Non définie	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Mercuriale 24	Mercuriale -6	Gaillet 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Matricaire 29	Matricaire -6	Laiteron rude -2	Matricaire 0	Matricaire 0
		Mercuriale 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0	Oct-d2	Gaillet 55
Gaillet -2	Gaillet -1	Laiteron rude 0		Laiteron rude 13
Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Mercuriale 0		Mercuriale 15
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Matricaire 0		Matricaire 17
Matricaire -2	Matricaire -1			

#### Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2  13  18  5  30	Association de cultures : Aucune Fort  -10  -10  -10  -10	Date des faux semis :  Date de semis du couvert :  Date de destruction :   0  -1  0  -1	Pas de labour  0  0  0  0	46 gr/m <sup>2</sup>  0  0  0  0
Entre rangs 12.5 cm  -2  -2  -2  -2	Variété Moyennement couvrante  -1  -1  -1  -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  0  0  0  0	Désherbage chimique   	Score annuel  0  4  0  16
Entre rangs 15 cm  -1  -1  -1  -1	Variété Moyennement couvrante  -1  -1  -1  -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  0  0  0  0	Désherbage chimique 	Score annuel  87  22  24  24

#### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1  95  30  32  32	Association de cultures : Aucune Moyen  -6  -6  -6  -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Date de destruction :   0  0  0  0	Pas de labour  0  0  0  0	350 gr/m <sup>2</sup>  0  0  0  0
Entre rangs 15 cm  -1  -1  -1  -1	Variété Moyennement couvrante  -1  -1  -1  -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  0  0  0  0	Désherbage chimique 	Score annuel  87  22  24  24