




Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Maïs sur maïs
Type de sol : limono-argilo-sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	89 
Chénopode	89 
Panic pied-de-coq	25 

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Renouée liseron 134</div> <div>Chénopode 68</div> <div>Panic pied-de-coq 36</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Oct-d1</div> Date de destruction : <div>Mar-d2</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Densité de semis 90 gr/m² <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>
Entre rangs 80 cm <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Renouée liseron -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Panic pied-de-coq -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d2</div> <div>Mai-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Avr-d2</div> <div>Renouée liseron -16</div> <div>Chénopode -8</div> <div>Panic pied-de-coq -8</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div> <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Renouée liseron 118</div> <div>Chénopode 59</div> <div>Panic pied-de-coq 28</div>