


Exploitation : Benoit Leroy  
Parcelle : A  
Type de sol : Limon argileux

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	<div>39</div> 

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Betteraves

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass 27</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Août-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Août-d2</div> Date de destruction : <div>Nov-d1</div> <div>Ray-grass -2</div>	<b>Date de labour</b> <div>Nov-d3</div> <div>Ray-grass -2</div>	<b>Densité de semis</b> Non défini <div>Ray-grass 0</div>
<b>Entre rangs</b> 50 cm <div>Ray-grass 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Avr-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass -1</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 22</div>

#### Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Nov-d1</div> <div>Ray-grass 18</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Nov-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -2</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Densité de semis</b> 260 gr/m² <div>Ray-grass 0</div>
<b>Entre rangs</b> 17 cm <div>Ray-grass 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 12</div>

### Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d1 Ray-grass 69	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -8	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 260 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 57

### Année 4 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d3 Ray-grass 96	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -3	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> Non défini Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 50 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -5	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 82

### Année 5 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Ray-grass 52	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -8	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 260 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 40