


Exploitation : Benoit Leroy  
Parcelle : C  
Type de sol : Limon argileux

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	<div>24</div> 

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Betteraves

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass 27</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Jan-d2</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Mar-d3</div> <div>Ray-grass -2</div>	<b>Densité de semis</b> Non défini <div>Ray-grass 0</div>
<b>Entre rangs</b> Non défini <div>Ray-grass 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Mar-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 25</div>

#### Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Nov-d1</div> <div>Ray-grass 18</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Nov-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -2</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Densité de semis</b> 280 gr/m² <div>Ray-grass 0</div>
<b>Entre rangs</b> Non défini <div>Ray-grass 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 12</div>

### Année 3 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d3 Ray-grass 96	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -3	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> Non défini Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Oct-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -4	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 83

### Année 4 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d1 Ray-grass 27	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Oct-d1 Mar-d3 Date de semis du couvert : Oct-d1 Date de destruction : Mar-d2 Ray-grass -6	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> Non défini Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -1	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 20

### Année 5 - Orge de printemps

<b>Date de semis</b> Déc-d2 Ray-grass 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Déc-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 220 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 0