



Exploitation : SAS ALSACE MAIS Nouveau  
Parcelle : Maïs  
Type de sol : LIMON ARGILE SABLEUX

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	47 
Renouée liseron	49 

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Oct-d3"/> <b>Chénopode</b> 8 <b>Renouée liseron</b> 1	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <b>Chénopode</b> -4 <b>Renouée liseron</b> -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Oct-d2"/> <b>Chénopode</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> <b>Chénopode</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0	<b>Densité de semis</b> 270 gr/m² <b>Chénopode</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0
<b>Entre rangs</b> 17.5 cm <b>Chénopode</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <b>Chénopode</b> -1 <b>Renouée liseron</b> -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <input type="text" value="Nov-d2"/> <input type="text" value="Oct-d3"/> <b>Chénopode</b> -0 <b>Renouée liseron</b> 0	<b>Désherbage chimique</b> <input type="text" value="Oct-d3"/> <input type="text" value="Mar-d2"/>	<b>Score annuel</b> <b>Chénopode</b> 3 <b>Renouée liseron</b> 0

## Année 2 - Maïs

<b>Date de semis</b> Mai-d1 Chénopode 57 Renouée liseron 130	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Luzerne Fort Chénopode -10 Renouée liseron -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Densité de semis</b> 10 gr/m² Chénopode 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b> 80 cm Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode 47 Renouée liseron 120

## Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d3 Chénopode 8 Renouée liseron 1	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Renouée liseron -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Oct-d2 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Densité de semis</b> 270 gr/m² Chénopode 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b> 17.5 cm Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Chénopode -1 Renouée liseron -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Oct-d3 Chénopode -0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage chimique</b> Oct-d3 Mar-d2	<b>Score annuel</b> Chénopode 3 Renouée liseron 0

## Année 4 - Maïs

<b>Date de semis</b> Mai-d1 Chénopode 57 Renouée liseron 130	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Luzerne Fort Chénopode -10 Renouée liseron -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Densité de semis</b> 10 gr/m² Chénopode 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b> 80 cm Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode 47 Renouée liseron 120

## Année 5 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Chénopode 5 Renouée liseron 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10 Renouée liseron -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Oct-d1 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Densité de semis</b> 270 gr/m² Chénopode 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b> 17.5 cm Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Oct-d3 Chénopode -0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage chimique</b> Oct-d3 Mar-d2	<b>Score annuel</b> Chénopode 0 Renouée liseron 0

## Année 6 - Pois de printemps

### Date de semis

Mai-d2

Chénopode 47

Renouée liseron

110

### Étouffement culture

Association de cultures :

Aucune

Très faible

Chénopode 0

Renouée liseron 0

### Interculture

Date des faux semis :

Date de semis du couvert :

Août-d1

Date de destruction :

Mai-d1

Chénopode 0

Renouée liseron

0

### Date de labour

Mai-d1

Chénopode -2

Renouée liseron

-6

### Densité de semis

38 gr/m<sup>2</sup>

Chénopode 0

Renouée liseron

0

### Entre rangs

30 cm

Chénopode 0

Renouée liseron

0

### Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Renouée liseron 0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Chénopode 0

Renouée liseron

0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Chénopode 45

Renouée liseron

104