





Exploitation : Non renseigné
Parcelle : nv système
Type de sol : limono-argileux-sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	35	
Renouée liseron	20	
Panic pied-de-coq	20	
Sétaire verte	21	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Oct-d3 Date de destruction : Mai-d1	Pas de labour	40 gr/m²
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Panic pied-de-coq 30	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Sétaire verte 30	Sétaire verte -6	Sétaire verte -4	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Très couvrante	Bineuse : Sep-d2 Houe rotative : Herse étrille : Sep-d1 Oct-d1	Aoû-d3	Chénopode 15
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode -4		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Panic pied-de-coq 13
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -3		Sétaire verte 13
Sétaire verte -2	Sétaire verte -2	Sétaire verte -3		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte -4	Sétaire verte -1	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Oct-d2	Nov-d3	Chénopode 2
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -1		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Sétaire verte 0
Sétaire verte -2	Sétaire verte -1	Sétaire verte 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Chénopode 31</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 30</p> <p>Sétaire verte 30</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Sétaire verte 0</p>	<p>Date des faux semis : Mar-d3 Date de semis du couvert : Oct-d1 Date de destruction : Mar-d3</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Sétaire verte 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Sétaire verte 0</p>	<p>90 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Sétaire verte 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>75 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Sétaire verte 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Sétaire verte 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Jun-d2 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Sétaire verte 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Mar-d3</p>	<p>Score annuel</p> <p>Chénopode 28</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 30</p> <p>Sétaire verte 30</p>

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mai-d1 Date de semis du couvert : Nov-d2 Date de destruction : Avr-d2	Pas de labour	65 gr/m²
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 128	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Panic pied-de-coq 58	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Sétaire verte 58	Sétaire verte 0	Sétaire verte -0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Jun-d3	Mai-d3 Mai-d1	Chénopode 44
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Renouée liseron 107
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -13		Panic pied-de-coq 53
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4		Sétaire verte 53
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte -4		

Année 5 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 2	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte -0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d1 Nov-d1		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0		Sétaire verte 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte -2	Sétaire verte 0		

