

Exploitation :

baloo

Parcelle :

bouy2

Type de sol :

Crayeux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	33
Folleavoine	10
Ray-grass	33
Renouée liseron	9

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Sep-d1</div> Chénopode 27 Folleavoine 32 Ray-grass 97 Renouée liseron 0	Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10 Folleavoine -10 Ray-grass -10 Renouée liseron -10	Date des faux semis : <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Aoû-d1</div> Date de semis du couvert : <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Non définie</div> Date de destruction : <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Non définie</div> Chénopode -2 Folleavoine 0 Ray-grass -2 Renouée liseron 0	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Pas de labour</div> Chénopode 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	500 gr/m ² Chénopode 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
11 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0		Chénopode 14 Folleavoine 21 Ray-grass 85 Renouée liseron 0

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<input type="button" value="Non définie"/> Chénopode 0	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :	<input type="button" value="Pas de labour"/> Chénopode 0	500 gr/m ²
Folle-avoine 0	Chénopode 0	<input type="button" value="Non définie"/> Date de destruction :	Folle-avoine 0	Chénopode 0
Ray-grass 0	Folle-avoine 0	<input type="button" value="Non définie"/>	Ray-grass 0	Folle-avoine 0
Renouée liseron 0	Ray-grass 0	Chénopode 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
	Renouée liseron 0	Folle-avoine 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
		Ray-grass 0		
		Renouée liseron 0		

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<input type="button" value="Non définie"/> Chénopode 0	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :	<input type="button" value="Pas de labour"/> Chénopode 0	500 gr/m ²
Folle-avoine 0	Chénopode 0	<input type="button" value="Non définie"/> Date de destruction :	Folle-avoine 0	Chénopode 0
Ray-grass 0	Folle-avoine 0	<input type="button" value="Jul-d3"/>	Ray-grass 0	Folle-avoine 0
Renouée liseron 0	Ray-grass 0	Chénopode 0	Renouée liseron 0	Ray-grass 0
	Renouée liseron 0	Folle-avoine 0		Renouée liseron 0
		Ray-grass 0		
		Renouée liseron 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
11 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
11 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1  Chénopode 35  Folle-avoine 14  Ray-grass 73  Renouée liseron 0	Association de cultures : Aucune Fort  Chénopode -10  Folle-avoine -10  Ray-grass -10  Renouée liseron -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Aoû-d1 Date de destruction :  Non définie  Chénopode 0  Folle-avoine 0  Ray-grass 0  Renouée liseron 0	  Chénopode 0  Folle-avoine 0  Ray-grass 0  Renouée liseron 0	180 gr/m ²  Chénopode 0  Folle-avoine 0  Ray-grass 0  Renouée liseron 0
Entre rangs 11 cm  Chénopode -2  Folle-avoine -2  Ray-grass -2  Renouée liseron -2	Variété Moyennement couvrante  Chénopode -1  Folle-avoine -1  Ray-grass -1  Renouée liseron -1	Désherbage mécanique Bineuse :  Mar-d2 Houe rotative :  Mar-d3  Mar-d1 Herse étrille :  Chénopode -3  Folle-avoine -5  Ray-grass -2  Renouée liseron -1	Désherbage chimique	Score annuel  Chénopode 19  Folle-avoine 0  Ray-grass 59  Renouée liseron 0

Année 5 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2  Chénopode 34  Folle-avoine 22  Ray-grass 88  Renouée liseron 0	Association de cultures : Aucune Fort  Chénopode -10  Folle-avoine -10  Ray-grass -10  Renouée liseron -10	Date des faux semis :  Aoû-d1 Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie  Chénopode -2  Folle-avoine 0  Ray-grass -2  Renouée liseron 0	  Chénopode 0  Folle-avoine 0  Ray-grass 0  Renouée liseron 0	250 gr/m ²  Chénopode 0  Folle-avoine 0  Ray-grass 0  Renouée liseron 0
Entre rangs 11 cm  Chénopode 0  Folle-avoine 0  Ray-grass 0  Renouée liseron 0	Variété Très couvrante  Chénopode -2  Folle-avoine -2  Ray-grass -2  Renouée liseron -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative :  Oct-d1 Herse étrille :  Chénopode 0  Folle-avoine 0  Ray-grass 0  Renouée liseron 0	Désherbage chimique	Score annuel  Chénopode 20  Folle-avoine 10  Ray-grass 74  Renouée liseron 0

Année 6 - Betteraves



Année 7 - Blé d'hiver

