






Exploitation : La mare aux abeilles  
Parcelle : A1 initiale VF Lin  
Type de sol : Limono- argileux

Commentaires :

VF avec intercultures

## Adventices étudiées :

| Adventices :  | Risque : |   |
|---------------|----------|---|
| Vulpin        | 48       |    |
| Ray-grass     | 49       |    |
| Laiteron rude | 45       |    |
| Sanve         | 41       |    |
| Ravenelle     | 72       |  |

## Système de culture

Situation initiale :

## Année 1 - Blé d'hiver

| Date de semis    | Étouffement culture                           | Interculture   | Date de labour      | Densité de semis |
|------------------|---|--|---------------------|------------------|
| Oct-d2           | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour       | Non défini       |
| Vulpin 60        | Vulpin -4                                     | Vulpin 0   | Vulpin 0            | Vulpin 0         |
| Ray-grass 52     | Ray-grass -4                                  | Ray-grass 0  | Ray-grass 0         | Ray-grass 0      |
| Laiteron rude 29 | Laiteron rude -4                              | Laiteron rude 0  | Laiteron rude 0     | Laiteron rude 0  |
| Sanve 21         | Sanve -4                                      | Sanve 0  | Sanve 0             | Sanve 0          |
| Ravenelle 48     | Ravenelle -4                                  | Ravenelle 0  | Ravenelle 0         | Ravenelle 0      |
| Entre rangs      | Variété                                       | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique | Score annuel     |
| Non défini       | Non couvrante                                 | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  | Oct-d3   Aoû-d2     | Vulpin 56        |
| Vulpin 0         | Vulpin 0                                      | Vulpin 0   |                     | Ray-grass 48     |
| Ray-grass 0      | Ray-grass 0                                   | Ray-grass 0  |                     | Laiteron rude 25 |
| Laiteron rude 0  | Laiteron rude 0                               | Laiteron rude 0  |                     | Sanve 17         |
| Sanve 0          | Sanve 0                                       | Sanve 0  |                     | Ravenelle 44     |
| Ravenelle 0      | Ravenelle 0                                   | Ravenelle 0  |                     |                  |

## Année 2 - Orge d'hiver

| Date de semis    | Étouffement culture                         | Interculture   | Date de labour           | Densité de semis |
|------------------|---|--|--------------------------|------------------|
| Oct-d2           | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour            | Non défini       |
| Vulpin 56        | Vulpin -10                                  | Vulpin 0   | Vulpin 0                 | Vulpin 0         |
| Ray-grass 48     | Ray-grass -10                               | Ray-grass 0  | Ray-grass 0              | Ray-grass 0      |
| Laiteron rude 27 | Laiteron rude -10                           | Laiteron rude 0  | Laiteron rude 0          | Laiteron rude 0  |
| Sanve 11         | Sanve -10                                   | Sanve 0  | Sanve 0                  | Sanve 0          |
| Ravenelle 44     | Ravenelle -10                               | Ravenelle 0  | Ravenelle 0              | Ravenelle 0      |
| Entre rangs      | Variété                                     | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique      | Score annuel     |
| Non défini       | Non couvrante                               | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  | Nov-d2   Oct-d3   Avr-d2 | Vulpin 46        |
| Vulpin 0         | Vulpin 0                                    | Vulpin 0   |                          | Ray-grass 38     |
| Ray-grass 0      | Ray-grass 0                                 | Ray-grass 0  |                          | Laiteron rude 17 |
| Laiteron rude 0  | Laiteron rude 0                             | Laiteron rude 0  |                          | Sanve 1          |
| Sanve 0          | Sanve 0                                     | Sanve 0  |                          | Ravenelle 34     |
| Ravenelle 0      | Ravenelle 0                                 | Ravenelle 0  |                          |                  |

### Année 3 - Colza d'hiver

| Date de semis  | Étouffement culture  | Interculture   | Date de labour   | Densité de semis  |
|--|--|--|--|---|
| <p>Aoû-d3</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Laiteron rude 19</p> <p>Sanve 16</p> <p>Ravenelle 30</p> | <p>Association de cultures :<br/>Aucune<br/>Moyen</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Laiteron rude -6</p> <p>Sanve -6</p> <p>Ravenelle -6</p> | <p>Date des faux semis :<br/>Date de semis du couvert :<br/>Non définie</p> <p>Date de destruction :<br/>Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p> | <p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p> | <p>Non défini</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p> |
| Entre rangs  | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique  | Score annuel  |
| <p>Non défini</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p>  | <p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p>                                       | <p>Bineuse :<br/>Houe rotative :<br/>Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p>   | <p>Oct-d3 Sep-d2 Aoû-d2</p> <p>Jan-d3</p>  | <p>Vulpin 83</p> <p>Ray-grass 90</p> <p>Laiteron rude 13</p> <p>Sanve 10</p> <p>Ravenelle 24</p>              |

### Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis  | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour   | Densité de semis  |
|--|---|--|--|---|
| <p>Oct-d2</p> <p>Vulpin 60</p> <p>Ray-grass 52</p> <p>Laiteron rude 29</p> <p>Sanve 21</p> <p>Ravenelle 48</p> | <p>Association de cultures :<br/>Aucune<br/>Faible</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Laiteron rude -4</p> <p>Sanve -4</p> <p>Ravenelle -4</p> | <p>Date des faux semis :<br/>Date de semis du couvert :<br/>Non définie</p> <p>Date de destruction :<br/>Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p> | <p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p> | <p>Non défini</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p> |
| Entre rangs  | Variété   | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique  | Score annuel  |
| <p>Non défini</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p>  | <p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p>  | <p>Bineuse :<br/>Houe rotative :<br/>Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p>   | <p>Oct-d3 Aoû-d2</p>   | <p>Vulpin 56</p> <p>Ray-grass 48</p> <p>Laiteron rude 25</p> <p>Sanve 17</p> <p>Ravenelle 44</p>              |

Année 5 - Lin de printemps

| Date de semis |    |
|---------------|----|
| Mar-d3        |    |
| Vulpin        | 35 |
| Ray-grass     | 33 |
| Laiteron rude | 46 |
| Sanve         | 74 |
| Ravenelle     | 58 |

| Étouffement culture                                |   |
|--|---|
| Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible |   |
| Vulpin   | 0 |
| Ray-grass  | 0 |
| Laiteron rude                                      | 0 |
| Sanve  | 0 |
| Ravenelle  | 0 |

| Interculture   |   |
|--|---|
| Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Aoû-d3<br>Date de destruction :<br>Déc-d1 |   |
| Vulpin   | 0 |
| Ray-grass  | 0 |
| Laiteron rude  | 0 |
| Sanve  | 0 |
| Ravenelle  | 0 |

| Date de labour |   |
|----------------|---|
| Pas de labour  |   |
| Vulpin         | 0 |
| Ray-grass      | 0 |
| Laiteron rude  | 0 |
| Sanve          | 0 |
| Ravenelle      | 0 |

| Densité de semis |   |
|------------------|---|
| Non défini       |   |
| Vulpin           | 0 |
| Ray-grass        | 0 |
| Laiteron rude    | 0 |
| Sanve            | 0 |
| Ravenelle        | 0 |

| Entre rangs   |   |
|---------------|---|
| Non défini    |   |
| Vulpin        | 0 |
| Ray-grass     | 0 |
| Laiteron rude | 0 |
| Sanve         | 0 |
| Ravenelle     | 0 |

| Variété       |   |
|---------------|---|
| Non couvrante |   |
| Vulpin        | 0 |
| Ray-grass     | 0 |
| Laiteron rude | 0 |
| Sanve         | 0 |
| Ravenelle     | 0 |

| Désherbage mécanique                            |   |
|---|---|
| Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |   |
| Vulpin  | 0 |
| Ray-grass                                       | 0 |
| Laiteron rude                                   | 0 |
| Sanve   | 0 |
| Ravenelle                                       | 0 |

| Désherbage chimique |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| Avr-d3              | Avr-d1 | Mar-d3 |

| Score annuel  |    |
|---------------|----|
| Vulpin        | 35 |
| Ray-grass     | 33 |
| Laiteron rude | 46 |
| Sanve         | 74 |
| Ravenelle     | 58 |